

TABAC ET CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE

FUMER MULTIPLIE PAR 6 LES RISQUES DE COMPLICATIONS POST OPERATOIRES

IL EST RECOMMANDE D'ARRÊTER DE FUMER 8 SEMAINES AVANT ET APRES UNE INTERVENTION ORTHOPEDIQUE

UN ARRÊT PARTIEL DU TABAC RÉDUIT MAIS N'ANNULE PAS CE RISQUE DE COMPLICATIONS

LES RISQUES SONT PRINCIPALEMENT:

- Complications générales respiratoires et cardiaques avec parfois risque vital
- Phlébites et embolies pulmonaires
- Mauvaise consolidation osseuse
- Mauvaise intégration des implants orthopédiques
- Retards de cicatrisation des plaies , voire non cicatrisation.
- INFECTION du site opératoire.

CHEZ LES FEMMES JEUNES, LA CONSOMMATION DE TABAC ASSOCIEE A LA PRISE DE PILULE CONTRACEPTIVE ET/OU LA PRATIQUE SPORTIVE EST EXTREMEMENT DANGEREUSE.

VOUS POUVEZ VOUS FAIRE AIDER POUR CESSER DE FUMER :

- Par votre médecin traitant
- En vous rendant à une consultation spécialisée de Tabacologie

VOUS DEVEZ SIGNALER AU CHIRURGIEN ET A L'ANESTHÉSISTE VOTRE ADDICTION TABAGIQUE, ILS VOUS DONNERONS LES RENSEIGNEMENTS UTILES POUR CESSER DE FUMER AVANT L'OPÉRATION.

SI VOUS CONTINUEZ À FUMER, VOUS ACCEPTEZ LES RISQUES ENCOEURUS

Je soussigné:

Déclare avoir lu et compris les risques encourus lors de mon opération par la consommation de tabac.